


GUIDE D'UTILISATION DE LA GRILLE DÉMARCHE D'ÉVALUATION

TOUT SOIGNANT EST A MÊME ET SE DOIT D'ÉVALUER LA DOULEUR DU PATIENT
ET DE RENSEIGNER LA GRILLE « EVALUATION DE LA DOULEUR »



UTILISATION DE LA GRILLE

1. coller l'étiquette du patient
2. localiser la douleur en hachurant sur les silhouettes la ou les parties douloureuses
3. choisir et utiliser l'échelle d'évaluation la plus adaptée pour votre patient
 - a. patient communicant : EVA, EN (à privilégier) ou EVS
 - b. patient non communicant :
 - DOLOPLUS chez un patient connu présentant des modifications de comportement, s'adresse à la douleur chronique
 - EOC chez un patient non ou peu connu ou chez un patient connu pour une douleur aiguë
4. noter la date et l'heure de l'évaluation
5. relever le résultat de l'évaluation sur la grille en respectant bien le code couleur :
 - a. **rouge** pour l'EVA et l'EN
 - b. **vert** pour l'EVS
 - c. **bleu** pour le Doloplus
 - d. **noir** pour l'EOC
6. préciser par « R » si douleur au repos et par « M » si douleur à la mobilisation
7. cocher par une croix si une antalgie supplémentaire est donné (=traitement à la demande)
8. signer de vos initiales

NB. pour les patients **sous morphine ou dérivés** (morphine, skénan, actiskénan, durogésic) tout signe de somnolence doit être évalué ou à défaut signalé soit :

- Une première évaluation de la **sédation** est réalisée à l'introduction du traitement puis renouvelée si somnolence ++
- la **fréquence respiratoire** sera évaluée si la sédation est ≥ 2 (à signaler si $FR \leq 10$)

Le patient est douloureux

→ L'évaluation de la douleur est poursuivie plusieurs fois par jour jusqu'à efficacité du traitement =douleur stable depuis au moins 3 jours consécutifs et inférieure au seuil de l'échelle utilisée (zone grisée sur la grille d'évaluation)

**La grille reste toujours ouverte.
Elle est utilisée dès qu'il y a
douleur ou modification du
comportement**