

### Prérequis :

**Appliquer les Précautions Standard :** *voir Annexe 1*

**Informers les professionnels et intervenants autorisés**

**Suspendre les visites** (sauf autorisation exceptionnelle)

**Appliquer les mesures barrières :**

- Gestes barrières : *voir Annexe 3*
- Hygiène des mains (HDM) par friction hydro alcoolique (FHA)\*
- Aération régulière

**Indications du port de masque :** *voir Annexe 4*

- Port du masque chirurgical pour tout soignant / intervenant dès l'entrée dans la chambre
- Port du masque FFP2 exclusivement pour le personnel soignant qui réaliserait des gestes invasifs ou manœuvres au niveau de la sphère respiratoire (prélèvement sphère nasopharyngé, kinésithérapie respiratoire, aspiration endotrachéale)

### Prise en charge de résident cas possible/probable/confirmé COVID-19 :

**Confinement du cas :**

- Chambre individuelle
- **Appliquer les prérequis**
- Arrêter les activités
- Distribuer les repas en chambre
- Privilégier l'utilisation de matériel à usage unique (UU) ou dédié au résident (thermomètre, bassin...)
- **Avoir à disposition :** lunettes de protection, tablier plastique UU ou sur blouse UU, masques chirurgicaux, produit hydro alcoolique, produit détergent-désinfectant\*

**Avant d'entrer dans la chambre :**

- Réaliser une FHA
- Mettre des lunettes de protection et un masque chirurgical
- Mettre un tablier plastique UU ou sur blouse UU pour tout soin de contact (change, toilette...)
- Réaliser une FHA
- Prévoir :
  - Gants à UU : à utiliser **UNIQUEMENT** pour les soins à risque de contact avec les produits biologiques d'origine humaine (urines, sang, selles...)
  - Supports de linge sale et déchets (DAOM/DASRI) proches de la chambre

**Dans la chambre :**

- Mettre un masque chirurgical au résident en continu lors des soins proches s'il le supporte

Après le soin :

- Nettoyer-désinfecter l'environnement proche du résident : utiliser un produit détergent-désinfectant\* (en respectant le temps de contact pour une virucidie indiquée par le fabricant)
- Eliminer en DAOM tablier/sur blouse et gants avant de sortir
- Réaliser une FHA

# Précautions d'Hygiène en EMS

## pour un résident cas possible/probable/confirmé COVID-19

(Version 18 mars 2020)

### A la sortie de la chambre :

- Si utilisation de dispositifs médicaux partagés : nettoyer-désinfecter avec produit détergent-désinfectant\* (stéthoscope, tensiomètre...)
- Retirer les lunettes de protection (voir fiche CPias « entretien des lunettes de protection »)
- Jeter le masque chirurgical en DAOM
- Réaliser une FHA

### Gestion excréta :

- Privilégier les sacs absorbants, à défaut le lave bassin
- **Pas d'utilisation** de douches ou douchettes

### Déchets : Eliminer les déchets selon la filière habituelle

**DAOM** en double sac plastique : gants, tabliers, protections absorbantes, emballages...

Eliminer régulièrement les sacs préalablement fermés

**DASRI** : selles liquides ou déchets avec présence de sang et/ou vomissements

Ne sont pas considérés comme DASRI : mouchoirs, masques usagés

*Pour rappel : FHA après toute manipulation*

### Bio nettoyage de la chambre :

- Porter : tablier plastique ou sur blouse UU, gants UU, masque chirurgical, lunettes de protection
- Préférer l'utilisation de chiffonnettes/bandeaux de lavage à UU.  
Si utilisation de chiffonnettes/bandeaux réutilisables : les traiter en lingerie à 60°C

#### Au quotidien :

- Aérer de manière régulière la chambre
- Utiliser un produit détergent-désinfectant\* en respectant le temps de contact pour une virucidie indiqué par le fabricant : pour les surfaces hautes et cabinet de toilette
- **Ou en cas** de non-conformité à la norme NF EN 14476, réaliser la procédure ICD (Javel) *voir Annexe 2*
- Nettoyer les sols selon la procédure habituelle
- **Renforcer le bio nettoyage des surfaces telles que : poignées de porte, barrières, interrupteurs, télécommandes, sonnettes, tablettes ...**

#### En sortie ou fin de période de contagiosité :

- Réaliser la procédure ICD (Javel) pour les sols et surfaces *voir Annexe 2*

### Repas / Vaisselle :

- Repas en chambre
- Prise en charge habituelle de la vaisselle

*Pour rappel : cycle de lavage à une température de 55°C à 60°C et un cycle de rinçage à plus de 85°C.*

# Précautions d'Hygiène en EMS

## pour un résident cas possible/probable/confirmé COVID-19

(Version 18 mars 2020)

### Linge :

- Suivre la filière et les procédures de l'établissement
- Privilégier le double emballage ou sac hydrosoluble
- Pour la manipulation : porter tablier plastique ou sur blouse UU, gants UU, masque chirurgical, lunettes de protection
- Pour le linge fragile : réaliser un prélavage et utiliser un produit lessiviel désinfectant
- **Bannir les mouchoirs tissu aux résidents**

*Pour rappel : Ne pas secouer les draps et le linge, ne pas plaquer les draps et le linge contre soi  
FHA après toute manipulation*

### Si entretien du linge par la famille :

- Entreposer le linge sale dans un sac plastique dans la chambre
- Quand la famille récupère le linge : prendre le sac et le déposer dans le sac de transport plastique de la famille (étiqueté)

### Conseils à donner à la famille :

- Ne pas secouer les draps et le linge
- Transporter les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose intermédiaire dans le logement.
- Laver le linge :
  - A part des autres personnes vivantes sous le même toit
  - dans une machine à laver avec un cycle à 60°C pendant 30 min au minimum. En cas de linge fragile, réaliser un prélavage.
- Réaliser une hygiène des mains en fin de manipulation

ANNEXE 1 : Précautions Standard



\* Produit répondant à la norme de virucidie NF EN 14476

## ANNEXE 2 : Procédure ICD (Javel)

- Nettoyer avec un produit détergent
- Rincer à l'eau du réseau
- Laisser sécher
- Désinfecter à l'Eau de Javel selon la dilution :

Utilisation en désinfection de l'Eau de Javel : solution à 2,6% diluée au 1/5 <sup>ème</sup>	
	Si utilisation de <b>berlingots de 250ml (solution à 9,6%)</b> : 1- dilution dans un flacon de 1 litre (berlingot de 250ml + 750ml d'eau froide pour obtenir une solution de 1 litre à 2,6%), 2- puis nouvelle dilution au 1/5 <sup>ème</sup> (1 litre de la solution préparée dans 4 litres d'eau)
	Si utilisation de <b>bidons de 1 ou 2 litres (solution à 2,6%)</b> : - dilution directe au 1/5 <sup>ème</sup> (1 litre du bidon dans 4 litres d'eau)



**A diluer dans de l'eau froide**

**Date de péremption :**

Berlingot : 3 mois après la date de fabrication indiquée dessus.

Bidon de 1 litre commercialisé : date de péremption indiquée.

**Solution à utiliser extemporanément.**



COVID-19

## FACE AU CORONAVIRUS : POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



**Se laver  
très régulièrement  
les mains**



**Tousser ou éternuer  
dans son coude  
ou dans un mouchoir**



**Utiliser un mouchoir  
à usage unique  
et le jeter**



**Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades**

**Vous avez des questions sur le coronavirus ?**



**GOVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS**




**0 800 130 000**  
(appel gratuit)

[https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus\\_gestes\\_barriere\\_spf.pdf](https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coronavirus_gestes_barriere_spf.pdf)

## Quel masque porter à l'hôpital et en EHPAD ?

Au sein d'une zone de circulation active du virus ("cluster")



### Comment mettre mon masque chirurgical ?



### Comment mettre mon masque FFP2 ?

